

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-4-67 641801

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)  
(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

ABONNEMENT ANNUEL  
25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 79 d'AVRIL 1967

le 26 AVRIL 1967

## GRANDE CULTURE

### INFORMATIONS

#### Charançons et limaces sur betteraves.-

Par suite du temps venteux et froid, la végétation des jeunes betteraves est particulièrement peu active. Surtout pour les semis clairs, il y a risque de dégâts du fait de charançons ou de limaces.

Les dégâts de charançons sont particulièrement à redouter en sol léger, chaud, près des bois ou à proximité de luzernières.

Les conditions climatiques de 1966 très favorables à la multiplication des limaces laissent craindre des attaques en toutes situations.

Surveiller très attentivement les cultures.

Alors que les insecticides organiques de synthèse à dose forte, appliqués par poudrage ou pulvérisation légère, sont actifs sur charançons, on doit avoir recours, contre les limaces, aux appâts à base de métaldéhyde.

#### Colza d'hiver.-

Charançon des siliques : Bien que les femelles matures se révèlent assez fréquentes, il apparaît qu'il y a intérêt à différer encore le traitement, les concentrations d'insectes n'étant pas à leur maximum.

#### Mouche de l'Asperge.-

Il est recommandé de réaliser un traitement sur les jeunes plantations non encore en rapport et de le renouveler toutes les quinze jours jusqu'à mi-juin.

71.197

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENT

Tavelures du pommier et du poirier.-

Le relèvement de la température va provoquer un développement rapide de la végétation, aussi l'ensemble des variétés doivent être traitées dès réception du présent avis.

Rappel : oïdium - couper toutes les pousses totalement envahies par ce champignon.

INFORMATIONS

Araignées rouges -

Les éclosions ont commencé dans la Marne; dans le département des Ardennes, elles ont été retardées par les températures basses. Attendre un prochain avis pour traiter.

Monilia et Anthracnose du cerisier.-

Intervenir dès la fin de la floraison. L'anthracnose est une maladie grave qui a sévi abondamment l'an dernier et qui a provoqué une chute précoce du feuillage.

Les produits préconisés sont : Doguadine, Manèbe, Dichlone, Phaltane, Captane, Thiram.

Pucerons verts du pommier.-

Les éclosions sont totales, surveiller attentivement les bouquets foliaires, refuge actuel des pucerons, dans les vergers où ce parasite a sévi l'an dernier.

Intervenir dès maintenant, ou attendre la fin de la floraison, selon l'état de végétation des arbres. Il est rappelé que seuls les insecticides suivants, non toxiques pour les abeilles, sont autorisés pendant la floraison :

Dicofol, Diéthion, Endosulfan, Phosalone, Polychlorocamphane, Pyrèthrines, Roténone, Thioquinox, Toxaphène.

Pucerons des pruniers - pêcheurs.-

Intervenir dès maintenant contre ces parasites avant l'enroulement du feuillage.

Les Contrôleur chargés des  
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytosanitaire de Champagne.